Patirtis
ir kokybė

Kompleksinė trėšimo programa vaiskrūmiams ir uogakrūmiams

Kompleksinė braškių tręšimo programa auginant dirvožemyje be laistymo sistemos 33000 vnt./ha daigų

Naudojimo laikas	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	150–200	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Prieš žydėjimą	Superba ruda	3–5	Tręšiama per lapus
	YaraLiva Nitrabor	150–200	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Žydėjimo metu	YaraLiva Calcinit Superba Mikromix	5 0,5	Tręšiama per lapus
Po žydėjimo	Unika Calcium	150–200	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Nuo uogų užmezgimo iki uogų sunokimo	YaraLiva Calcinit Nutrifol žalias	5 3	Tręšiama per lapus 2 kartus. Tręšimas kartojamas kas 7–10 dienų, Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias
Po derliaus surinkimo	YaraMila Complex	200–300	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +20^0 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Kompleksinė braškių tręšimo programa auginant durpių arba kokoso substrate

Naudojimo laikas	Trąšų talpa A*	Trąšų talpa B*	Trąšų talpa C
Įsišaknijimas	Superba ruda–50 kg Kristalon geltonas–25 kg	Yara Liva Calcinit–50 kg	Azoto rūgštis– 55%
Vegetatyvinis augimas	Superba ruda–50 kg Kristalon geltonas–25 kg	Yara Liva Calcinit–50 kg	Azoto rūgštis–55%
Žydėjimas	Superba ruda–25 kg Kristalon geltonas–50 kg	Yara Liva Calcinit–50 kg	Azoto rūgštis–55%
Uogų mezgimas	Nutrifol žalias–75 kg	Yara Liva Calcinit–50 kg	Azoto rūgštis–55%
Derėjimas	Nutrifol žalias–50 kg	Yara Liva Calcinit–50 kg	Azoto rūgštis–55%

Dėmesio: Rekomenduojamas trąšos ištirpimas 1000 l vandens ir gaunamas koncentruotas tirpalas, kuris vėliau yra skiedžiamas santykiu 1:100. Laistomo tirpalo druskų koncentracija EC 2–2,5; pH 5,5–6,5

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus augalų būklę ir meteorologines sąlygas.

Kompleksinė braškių tręšimo programa auginant dirvožemyje su laistymo sistema 33000 vnt./ha daigų

Naudojimo laikas	Naudojamos trąšos	Trąšų normos kg/ha ir tręšimo būdas*
Prieš augalų sodinimą arba vegetacijos pradžioje	YaraMila Complex	150–200 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Vegetacijos pradžioje	Kristalon geltonas	15
Augimo metu 1 savaitė	Yara Liva Calcinit** Kristalon geltonas	15 15
Augimo metu 2 savaitė	Superba ruda	15
Augimo metu 3 savaitė	Yara Liva Calcinit** Superba ruda	15 15
Augimo metu 4 savaitė	Nutrifol žalias	15
Žydėjimo pradžioje	Nutrifol žalias Superba ruda	15 35
Po žydėjimo 1 savaitė	Nutrifol žalias	15
Po žydėjimo 2 savaitė	Yara Liva Calcinit** Nutrifol žalias	15 35
Po žydėjimo 3 savaitė	Nutrifol žalias Superba ruda	15 15
Uogų skynimo pradžioje	Yara Liva Calcinit**	15
Uogų skynimo metu 1 savaitė	Superba ruda	15
Uogų skynimo metu 2 savaitė	Nutrifol žalias	15
Uogų skynimo metu 3 savaitė	Yara Liva Calcinit**	15
Uogų skynimo metu 4 savaitė	Nutrifol žalias	15
Uogų skynimo pabaigoje	Superba ruda	15
Po skynimo 1 savaitė	Nutrifol žalias	35
Po skynimo 2 savaitė	Superba ruda	15

Dėmesio: Rekomenduojama tręšimo norma tręšiant 1ha plotą kas 6–7 dienas. Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05-0,3% (0,5–3kg/1000l); pH 5,5–6,5.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus augalų būklę ir meteorologines sąlygas.

Kompleksinė vasarinių aviečių ir gervuogių tręšimo programa auginant dirvožemyje be laistymo sistemos 5000 vnt./ha daigų

Naudojimo laikas	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	200–250	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Pirmais sodinimo metais	Kristalon geltonas	3	Tręšiama per lapus
Ūglių vystymosi metu	Superba ruda Magnio sulfato	3–5 3	Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas kartojamas kas 7–10 dienų
Žydėjimo pradžioje	YaraLiva Calcinit Superba Mikromix	5 0,5	Tręšiama per lapus
	Unika Calcium	250–300	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Uogų augimo metu iki sunokimo	YaraLiva Calcinit Nutrifol žalias	5 3	Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 5–7 dienas Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias
Po uogų surinkimo	Superba ruda Magnio sulfatas Cinko chelatas Boras	3 3 2 2 litrai	Tręšiama per lapus 1 kartą 7 dienos po derliaus surinkimo

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +20^0 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Kompleksinė vasarinių aviečių ir gervuogių tręšimo programa auginant dirvožemyje su laistymo sistema 5000 vnt./ha daigų

Naudojimo laikas	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas*
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	250–300	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai	YaraLiva Calcinit** Superba ruda	8 12	Tręšiama 6–7 savaites
Žydėjimo–derėjimo metu	YaraLiva Calcinit** Nutrifol žalias	15 25	Tręšiama 6–7 savaites
Po uogų surinkimo	Nutrifol žalias	7	Tręšiama 4 savaites

Dėmesio: Rekomenduojama tręšimo norma tręšiant 1 ha plotą kas 6–7 dienas.
Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3 kg/1000 l); pH 5,5–6,5.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus augalų būklę ir meteorologines sąlygas.

Kompleksinė rudeninių aviečių tręšimo programa auginant dirvožemyje be laistymo sistemos 5000 vnt./ha daigų

Naudojimo laikas	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	200–250	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Tik pirmais sodinimo metais	Kristalon geltonas	3	Tręšiama per lapus
Ūglių vystymosi metu	Superba ruda Magnio sulfatas	3–5 3	Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas kartojamas kas 7–10 dienų
	YaraLiva Nitrabor	200–250	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Žydėjimo pradžioje	YaraLiva Calcinit Superba Mikromix	5 0,5	Tręšiama per lapus
	Unika Calcium	150–200	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Uogų augimo metu iki sunokimo	YaraLiva Calcinit Nutrifol žalias	5 3	Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 5–7 dienas Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias
Po uogų surinkimo	Superba Mikromix	0,5	Tręšiama per lapus

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +20^0 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Kompleksinė rudeninių aviečių tręšimo programa auginant dirvožemyje su laistymo sistema 5000 vnt./ha daigų

Naudojimo laikas	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas*
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	250–300	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai (gegužės 15 d.–birželio 30 d.)	YaraLiva Calcinit** Superba ruda	12 12	Tręšiama 6–7 savaites
Prieš žydėjimą iki derėjimo pradžios (liepos 1d.–rugpjūčio 31 d.)	YaraLiva Calcinit** Nutrifol žalias	10 20	Tręšiama 8–9 savaites
Uogų derėjimo metu (nuo rugsėjo 1 d.)	Nutrifol žalias YaraLiva Calcinit**	10 10	Tręšiama 6 savaites

Dėmesio: Rekomenduojama tręšimo norma tręšiant 1 ha plotą kas 6–7 dienas.
Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3 kg/1000 l); pH 5,5–6,5.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus augalų būklę ir meteorologines sąlygas.



Kompleksinė šilauogių tręšimo programa auginant be laistymo sistemos 3300 vnt./ha daigų

Laikotarpis	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas
Pavasarį tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex Amonio sulfatas	150–200 100	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Prieš žydėjimą / Žydėjimo pradžioje	Superba ruda Magnio sulfatas	3–5 3	Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas kartojamas kas 5–7 dienas
Žydėjimo pabaigoje	YaraMila Complex Amonio sulfatas	100–150 100	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
	Superba ruda Magnio sulfato	3–5 3	Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas kartojamas kas 5–7 dienas
Uogų augimo metu	YaraLiva Calcinit Nutrifol žalias	5 3	Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 7–10 dienų, Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias
Uogų nokimo metu	YaraLiva Calcinit Nutrifol žalias	5 3	Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 7–10 dienų, Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias
Derliaus pradžioje	Unika Calcium	150–200	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Po uogų surinkimo	Superba ruda Magnio sulfatas Cinko chelatas Boras	3 3 2 2 litrai	Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas kartojamas kas 7–10 dienų

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +20^0 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Kompleksinė šilauogių tręšimo programa auginant su laistymo sistema 3300 vnt./ha daigų

Laikotarpis	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas*
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	150–200	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Žydėjimo pradžioje	Superba ruda Nutrifol žalias Magnio sulfatas	15 15 5	Tręšiama kas 6–7 dienas
Žydėjimo metu	Superba ruda Nutrifol žalias Magnio sulfatas	10 20 5	Tręšiama kas 6–7 dienas
Po žydėjimo iki uogų skynimo	Superba ruda Nutrifol žalias Magnio sulfatas	25 25 5	Tręšiama kas 6–7 dienas
Uogų derėjimo metu	Superba ruda Nutrifol žalias Magnio sulfatas	10 20 5	Tręšiama kas 6–7 dienas
Po uogų derėjimo	Nutrifol žalias	15	Tręšiama kas 6–7 dienas

Dėmesio: Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3kg/1000l); pH 3,5–4,5.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus augalų būklę ir meteorologines sąlygas.

Kompleksinė sausmedžių tręšimo programa auginant be laistymo sistemos 4000–5000 vnt./ha daigų

Naudojimo laikas	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas
Pavasarį tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	200–250	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Žydėjimo pradžioje	Superba ruda Magnio sulfatas	3–5 3	Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas kartojamas kas 5–7 dienas
Žydėjimo pabaigoje	Unika Calcium	200–250	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
	Superba ruda Magnio sulfatas	3–5 3	Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas kartojamas kas 5–7 dienas
Uogų augimo metu iki derėjimo	YaraLiva Calcinit Nutrifol žalias	5 3	Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 5–7 dienas, Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias
Po uogų surinkimo	Nitrabor	200–250	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
	Superba ruda Magnio sulfatas	3 3	Tręšiama per lapus 3 kartus, tręšimas kartojamas kas 7–10 dienų

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +20^0 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Kompleksinė sausmedžių tręšimo programa auginant su laistymo sistema 4000–5000 vnt/ha augalų

Naudojimo laikas	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas*
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	200–250	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Žydėjimo metu	Superba ruda Yara Liva Calcinit**	12 10	Tręšiama kas 6–7 dienas
Po žydėjimo iki uogų skynimo	Nutrifol žalias Yara Liva Calcinit**	15 10	Tręšiama kas 6–7 dienas
Po uogų derėjimo	Nutrifol žalias Yara Liva Calcinit**	8 8	Tręšiama kas 6–7 dienas

Dėmesio: Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3kg/1000l); pH 5,5–6,5. Rekomenduojama tręšimo norma tręšiant 1ha plotą kas 6–7 dienas.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus augalų būklę ir meteorologines sąlygas.

Kompleksinė juodųjų serbentų tręšimo programa auginant be laistymo sistemos 5000 vnt./ha daigų

Naudojimo laikas	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas
Prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	200–250	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Prieš žydėjimą	Superba ruda Magnio sulfatas	3–5 3	Tręšiama per lapus
Žydėjimo metu	Nutrifol žalias Superba ruda Magnio sulfatas	3–5 3–5 3	Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 5–7 dienas Nutrifol žalias kaitaliojant su Superba ruda
Žydėjimo pabaigoje	YaraLiva Nitrabor	150–200	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Nuo uogų augimo iki uogų derėjimo	YaraLiva Calcinit	5	Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 5–7 dienas
Po uogų surinkimo	YaraLiva Nitrabor	150–200	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
	Superba Mikromix Superba ruda Magnio sulfatas	0,5 3–5 3	Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas kartojamas kas 7–10 dienų

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +20^0 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Kompleksinė juodųjų serbentų tręšimo programa auginant su laistymo sistema 5000 vnt/ha augalų

Naudojimo laikas augaluose	Naudojamos trąšos	Trąšų norma kg/ha	Tręšimo būdas*
Pavasarį, tik prasidėjus vegetacijai	YaraMila Complex	200–250	Paskleidžiama pakrikai ant dirvos paviršiaus arba šaknų augimo zonoje
Žydėjimas	Superba ruda Yara Liva Calcinit**	12 10	Tręšiama kas 6–7 dienas
Po žydėjimo iki uogų skynimo	Nutrifol žalias Yara Liva Calcinit**	15 10	Tręšiama kas 6–7 dienas
Po derėjimo tręšti 4 savaites	Nutrifol žalias Yara Liva Calcinit**	8 8	Tręšiama 4 savaites

Dėmesio: Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3kg/1000l); pH 5,5–6,5.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus augalų būklę ir meteorologines sąlygas.

Rekomenduojamos trąšos

	Pavadinimas	Sudėtis	Trąšų aprašymai
	YaraMila COMPLEX	Azotas – 12% Fosforas – 11% Kalis – 18% Magnis – 2,6% +mikroelementai	Kompleksinė granuliuota trąša su mikroelementais. Be chloro. Fosforas yra augalams lengvai pasisavinamos formos, netgi esant nepalankioms dirvožemio sąlygoms.
	YaraLiva TROPICOTE (kalcio salietra laukams)	Azotas – 15,5% Kalcis – 26,5%	Ideali granuliuota kalcio – amonio trąša, skirta pagrindiniam tręšimui. Azotas ir kalcis yra vandenyje tirpios formos, lengvai įsisavinamas, ypač tinka stresinių augimo sąlygų (sausros, šalnų, netinkamos priežiūros) paveiktiems augalams. Stabilizuoja dirvožemio pH
	YaraLiva NITRABOR (kalcio salietra laukams su boru)	Azotas – 15,5% Kalcis – 26,5% Boras – 0,3%	
	YaraLiva CALCINIT (kalcio salietra laistymui)	Azotas – 15,5% Kalcis – 26,5%	Visiškai tirpi granuliuota trąša – gerai įsisavinamo azoto ir kalcio šaltinis. Puikiai tinka tręšti per lapus ir laistyti. Skatina geresnį vaisių nusispalvinimą, vaisiai tampa tvirtesni, pagerėja jų sandėliavimo savybės. Stabilizuoja dirvožemio pH.
	Nutrifol (žalias)	Azotas – 8% Fosforas – 11% Kalis – 36% Magnis – 3% + mikroelementai	Kompleksinė trąša su dideliu kalio kiekiu, praturtinta mikroelementais, skirta tręšti per lapus. Naudojama antroje vegetacijos pusėje, kai mažėja azoto ir didėja kalio poreikis. Puikiai tirpsta vandenyje. Mikroelementai yra chelatų formoje, todėl augalai juos greitai ir efektyviai įsisavina.
	Superba (ruda)	Azotas – 14% Fosforas – 10% Kalis – 25% Magnis – 3% + mikroelementai	Puikiai vandenyje tirpstanti, kompleksinė bechlorė trąša su makro- ir mikroelementais, skirta augalų tręšimui pirmoje vegetacijos pusėje, kol susiformuos augalų žiedynai ir vaisiai. Mikroelementai yra chelatų formoje, todėl augalai juos greitai ir efektyviai įsisavina.
	Kristalon (geltonas)	Azotas – 13% Fosforas – 40% Kalis – 13% +mikroelementai	Tiksliai subalansuota, puikiai vandenyje tirpstanti kompleksinė trąša, su dideliu fosforo kiekiu, praturtinta makro– ir mikroelementais (chelatų formoje), kurie skatina geresnį augalo vystymąsi, stimuliuoja šaknų sistemos, stiebų ir lapų augimą.
	Unika Calcium	Azotas – 14% Kalis – 24% Kalcis – 12%	Granuliuota azoto, kalio ir kalcio trąša skirta chlorui jautriems augalams. Kalio ir kalcio kiekis gerina vaisių, uogų ir daržovių išvaizdą, skonines savybes. Didina atsparumą nepalankiam aplinkos poveikiui. Stabilizuoja dirvožemio pH.

Dirvožemio vertinimas pagal makroelementų kiekį dirvožemyje mg/kg

Vertinimas	N min. kg/ha	P_2O_5	K_2O	MgO (pH>6,0)	CaO	SO_4^{2-}
Labai mažai	<30	0–50	0–50	<100	<1000	<10,0
Mažai	31–60	51–100	51–100	101–150	1001–3800	10–15
Vidutiniškai	61–90	101–150	101–150	151–200	3801–6500	15–30
Pakankamai	91–120	151–200	151–200	201–300	6501–9200	>30
Labai daug	>120	200–300	201–300	>300	>9200	>30

Dirvožemio vertinimas pagal augalų pasisavinamų mikroelementų kiekį dirvožemyje mg/kg

Vertinimas	Mo	B	Co	Cu	Zn	Mn
Labai mažai	<0,05	<0,1	<0,2	<0,3	<1,0	<1,0
Mažai	0,06–0,15	0,1–0,3	0,2–1,5	0,3–1,5	1–2	1,1–10
Vidutiniškai	0,16–0,3	0,3–06	1,5–4	1,5–3,0	2–3	10–50
Pakankamai	0,3–0,5	0,6–1	4–5	3–7	3–7	50–100
Labai daug	>0,5	>1	>5	>7	>7	>100

Vandens pH reguliavimas naudojant azoto rūgštį

„Geras“ vanduo

kai tirpalui ruošti skirtame vandenyje yra hidrokarbonatų HCO_3, kurie neviršija 185 mg/l, kalcio (Ca) – 88 mg/l, magnio (Mg) – 10 mg/l

„Patenkinamas“ vanduo

kai tirpalui ruošti skirtame vandenyje yra hidrokarbonatų HCO_3, kurie neviršija 279 mg/l, kalcio (Ca) – 75 mg/l, magnio (Mg) – 25 mg/l

„Blogas“ vanduo

kai tirpalui ruošti skirtame vandenyje yra hidrokarbonatų HCO_3 – 490 mg/l, kalcio (Ca) – 83 mg/l, magnio (Mg) – 36 mg/l



UAB AGROCHEMIJOS PASLAUGŲ CENTRAS

Pramonės g. 3a, LT-56110 Kaišiadorys
Tel. +370 346 51634, mob. tel. +370 679 29304

Agronomas-konsultantas:
Tadas Venckus
Mob. tel. +370 648 18916, el. paštas: agronomas@apc.lt
www.apc.lt